

Gießener Früherkennungsschema I

– Die erste Stunde nach der Geburt

| Zeitpunkt der Beurteilung | Beurteilte Kriterien | Punkte | |
|--|--|--------|--|
| 1.-2. Minute nach der Geburt | Lage und Situation unmittelbar nach der Geburt... <ul style="list-style-type: none"> • Erhobener Kopf, Brustlage, regelmäßige Atmung (Maulspalte geschlossen) | 3 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Seitenlage, regelmäßige Atmung (Maulspalte geschlossen) | 2 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Seitenlage, unregelmäßige Atmung (Maulspalte geschlossen) | 1 | |
| Bis 30 Minuten nach der Geburt | Lage und Situation... <ul style="list-style-type: none"> • Erste Aufstehversuche | 3 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Verharren in Brust- oder Seitenlage | 2 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Verharren in Brust- oder Seitenlage und Krampfanfälle | 1 | |
| Bis 60 Minuten nach der Geburt | Lage und Situation... <ul style="list-style-type: none"> • Sicheres Stehen, erster Euterkontakt | 3 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Unsicheres Stehen, häufiges Liegen, Kopf jedoch angehoben | 2 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Verharren im Liegen (Seitenlage, abgestützter Kopf) | 1 | |
| Gesamtpunktzahl der Bewertung: | | | |
| Vitales Fohlen: <u>8 – 9 Punkte</u> → Kein Tierarzt erforderlich Gefährdetes Fohlen: <u>6 – 7 Punkte</u> → Tier erneut kontrollieren; ggf. Tierarzt Hochgradig gefährdetes Fohlen: <u>< 6 Punkte</u> → Tierarzt <u>sofort</u> informieren!!! | | | |

(Aus „Der Praktische Tierarzt 95, Heft 3 (2014)“ Seite 247)

Gießener Früherkennungsschema II

– Die 2. – 24. Stunde nach der Geburt

| Zeitpunkt der Beurteilung | Beurteilte Kriterien | Punkte | |
|--|--|--------|--|
| Ab einer Stunde nach der Geburt aufwärts | 1. Stehvermögen • Erhobener Kopf, Brustlage, regelmäßige Atmung (Maulspalte geschlossen) | 3 | |
| | • Seitenlage, regelmäßige Atmung (Maulspalte geschlossen) | 2 | |
| | • Seitenlage, unregelmäßige Atmung (Maulspalte geschlossen) | 1 | |
| Regelmäßig kontrollieren | 2. Körpertemperatur °C • 38,0 - 39,2 | 3 | |
| | • > 39,2 (z.B. Sepsis / Infektion) | 2 | |
| | • < 38,0 (niedrige Energieversorgung) | 1 | |
| 8 h nach der Geburt | 3. Mekoniumabgang • Bis 8 h nach der Geburt, dann Milchkot | 3 | |
| | • Geringe Mengen, häufiges Pressen, zunehmende Unruhe | 2 | |
| | • Kein Kotabsatz beobachtet, häufiges Pressen, Unruhe | 1 | |
| Regelmäßig kontrollieren | 4. Harnabsatz • Im Strahl, ausreichende Menge | 3 | |
| | • Häufiger Harndrang, Absatz kleiner Mengen oder Tropfen | 2 | |
| | • Kein Harnabsatz beobachtet | 1 | |
| Regelmäßig kontrollieren | 5. Atmung • Regelmäßig, gleichmäßig | 3 | |
| | • Unregelmäßig | 2 | |
| | • Stoßweise oder flach, geblähte Nüstern | 1 | |
| Regelmäßig kontrollieren | 6. Kontakt zur Mutterstute • Regelmäßiger Kontakt, Aufsuchen des Euters, Sauggeräusche | 3 | |
| | • Erheblicher Abstand zur Mutter, kaum oder abnehmender Euterkontakt | 2 | |
| | • Umherirren ohne Mutterkontakt, kein Aufsuchen des Euters | 1 | |
| Gesamtpunktzahl der Bewertung: | | | |
| <p>Vitales Fohlen: 18 Punkte → Kein Tierarzt erforderlich Gefährdetes Fohlen: 15-17 Punkte → Tier erneut kontrollieren; ggf. Tierarzt Hochgradig gefährdetes Fohlen: < 15 Punkte → Tierarzt <u>sofort</u> informieren!!!</p> | | | |